

## ВРАБАЦ



Домаћи врабац је мала птица дужине од 14 до 16 центиметара. Мужјак има сиву круну, образе и стомак, док су му врат и кљун црне боје. Лети му је кљун плаво-црн, а ноге браон боје. Зими им је перје бледе и суморне боје, а кљун је жућкасто-браон.

Женка нема црну боју на врату, кљуну и глави, нити сиву круну. Млади врапци имају тамније браон паперје и перје, а кљун је светложут.

Млади врапци се хране ларвама инсеката, углавном ларвама штеточина. Одрасли, између осталог, једу семење и зрневље, а понекад лове и лептире. У пролеће,

врапце привлачи цвеће, поготово жуте боје, којим се такође хране (шафран, јагорчевина).

Врапци се гнезде на различитим местима: испод стрехе, у рупама и шупљинама зграда, на пузавици и бршљану око кућа, на морским гребенима и у жбуњу. Гнездо смештено у бршљану или у рупи често је неуредно, изграђено од сламки и остатака смећа и напуњено перјем. Пространа и добро изграђена гнезда су она на дрвећу и у грмљу, највише у сеоским крајевима.

Домаћи врапци су веома агресивни око отимања места где ће се гнездити и често насилно уништавају гнезда претходних станара, а понекад директно граде сопствено гнездо на постојеће, у којем се налазе живи птићи. Ласте и птице из рода плаве птице (лат. *Sialia*) су посебно осетљиве на овакво понашање.

Пет до шест прашњавих јаја, ишараних црно-сивим пегам на крем белој подлози су типичан опис јаја која легу врапци. Варирају у величини и облику, као и у шарамма. Домаћи врабац има најкраћи инкубациони период од свих птица - 10 до 12 дана. У Новој Енглеској, у САД, женка у току лета може да излеже и до 25 јаја.

